Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 12:59

Link do produktu: https://sportowesuplementy.pl/vernikabon-syrop-100-ml-bonimed-p-1530.html



VERNIKABON SYROP 100 ml - Bonimed

Cena	**34,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**5906395039258**
Producent	**Bonimed**
Produkt	**Suplement diety.**
Uwagi	**Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.**

Opis produktu

VERNIKABON SYROP 100 ml - Bonimed

Vernikabon syrop ziołowo-miodowy

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Do postępowania dietetycznego w zakażeniu pasożytami jelitowymi.

Preparat ziołowy wspomagający proces trawienia i prawidłową pracę jelit u osób, u których występują pasożyty jelitowe.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu 4 łyżeczki (ok. 16g) zawiera: Miód pszczeli12,8g, wyciąg z ziela piołunu 600 mg, Wyciąg z nasion czarnuszki 600mg,400 mg ekstraktu z łupiny orzecha włoskiego, 120 mg ekstraktu z róży, 0,12 mg olejku goździkowego, po 0,11 mg olejku kminkowego i tymiankowego, po 0,1 mg olejku kolendrowego, miętowego i cytrynowego.

Składniki: miód pszczeli*, woda, wyciąg z ziela piołunu, wyciąg z nasion czarnuszki, ekstrakt z łupiny orzecha włoskiego, ekstrakt z róży, olejki: goździkowy, kminkowy, tymiankowy, kolendrowy, miętowy, cytrynowy, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.

* Miód nektarowy, wielokwiatowy

Polecamy spożywać: 2 razy dziennie po 1-2 łyżeczek przed jedzeniem. Po 7 dniach zrobić 1 tydzień przerwy i ponownie stosować przez 7 dni. Powyższy cykl można powtarzać co 2-3 miesiace. Ponizej 6 roku życia stosować 2 razy dziennie po 1 łyżeczce prepartu. Dawkowanie poniżej 3 roku życia skonsultować z lekarzem.

Miód w preparacie może ulegać krystalizacji, dlatego można go ogrzać w ciepłej wodzie.

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. poniżej 25 0C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed promieniami słonecznymi. Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Ważna informacja: Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

Ostrzeżenia: Nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu, mentol lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae). Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie stosować w przypadku niedrożności dróg żółciowych.

Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

Zawartość netto: 100ml

Producent: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec

Publikacje naukowe:

- Dalaviz et al.; A Review Study on Phytochemistry and Pharmacology Applications of Juglans Regia Plant; Pharmacognosy Review; 2017; 22(11): 145
- Ożarowski, W. Jaroniewski; Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych; 1987
- Lamer-Zarawska et al.; Fitoterapia i leki roślinne; Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007
- Matławska; Farmakognozja; Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu; 2006
- Ayaz et al.; The effect of Nigella sativa oil against Aspiculuristetraptera and Hymenolepis nana in naturally infected mice; Saudi Medical Journal; 2007: 28(11): 1654
- Abu El Ezz; Effect of Nigella sativa and Allium cepa oils on Trichinella spiralis in experimentally infected rats; Journal of the Egyptian Society of Parasitology; 2005; 35(2): 511
- Mańkowska, W. Bylka; Nigella sativa L. – związki czynne, aktywność biologiczna; Herba Polonica; 2009; 55(1): 109
- Błecha; Nasiona czarnuszki siewnej nadzieją dla alergików; Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna (Materiały naukowe z I Międzynarodowej Konferencji); 2013: 79
- Pensel et al.; Efficacy of essential oils of Thymus vulgaris and Origanum vulgare on Echinococcus granulosus; Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases; 2014; 2014: 693289
- Kędzia, E. Hołderna-Kędzia; Lecznicze działanie miodu pszczelego w chorobach wewnętrznych, MedPharm Polska; 2010